

PATIENTLABEL:

Ortopædkirurgisk afdeling M



Operationsdata

Primær operation

År

Kontinuationsnummer

E

Dato kl.

Udfyldt af (Fulde navn): _____

Operatørkode Assistentkode

Pt. er informeret om brudtype, behandlingsmuligheder og alternativer og accepterer behandlingen

- Nej
 Ja
 Pt. kan ikke svare, pårørende accepterer den planlagte operative behandling

0 Pt. venter under 24 timer på operation

Årsag til at pt. ikke opereres inden 24 timer efter indlæggelsen

- 1 Pt. venter på medicinsk tilsyn
 2 Anæstesiafdelingen venter på at pt. stabiliseres medicinsk
 3 Pt. venter på ledig plads i operationsprogrammet

Anæstesiform (evt. flere krydser)

- 1 N. femoralis blokade
 2 N. ischiadicus blokade
 3 Singleshot sacral epidural blokade
 4 Spinal
 5 Sedativa (dormicum, propofol mv)
 6 Universel anæstesi

Antibiotika profylakse

- 1 Cefuroxim
 2 _____

Side

- 0 Højre
 1 Venstre

Røntgenkonf. / stuegang udfyldt

D. _____ af _____
 Ved røntgenkonference
 Ved stuegang

Patologisk fraktur

- 0 Nej
 1 Ja

Stabilitet osteosyntese:

- 0 Ikke aktuelt
 1 Belastningsstabil
 2 Ikke belastningsstabil

Frakturtype (y):

- 0 Ingen fraktur
 1 Trochanter fraktur stabil
Collum: (y=0)
 2 Medial collum - Garden 1-2
 3 Medial collum - Garden 3-4
Pertrochantær: (y=1)
 4 2 fragm. udisloc. - Evans 1
 5 2 fragm. disloc. - Evans 2
 6 Afspr. troch. major - Evans 3
 7 Afspr. troch. minor - Evans 4
 8 Afspr. af troch. minor og major - Evans 5
Basocervical: (Y=1)
 9 Basocervical
Subtrochantær: (Y=2)
 10 2 fragmenter udisloceret
 11 2 fragmenter disloceret
 12 3-5 fragmenter

Operationstype

- 0 Konservativ behandling
 1 AO skruer
 2 DHS
 3 Marvsøm
 4 Hemialloplastik, unipolær
 5 Hemialloplastik, bipolar
 6 Totalalloplastik (Husk hoftereg.)
 7 Girdlestone

Femur-stem

- 0 Ikke aktuelt
 1 Moore
 2 Ultima
 3 Thompson
 4 Bimetric
 5 _____

Vurdering af reposition

- 0 Ikke aktuelt
 Røntgen viser:
 1 God stilling
 2 Acceptabel stilling
 3 Ikke acceptabel stilling

Vurdering af osteosyntese

- 0 Ikke aktuelt
 Røntgen viser:
 1 God stilling
 2 Acceptabel stilling
 3 Ikke acceptabel stilling

Fiksation af femur hemi-komponent

- Ikke aktuelt
 Ucementeret (NFB02)
 Cement med antibiotika (NFB12)

Peroperative komplikationer

- Ingen
 Femurfraktur

Dræn

- Nej
 Ja, antal: _____

Postop. dokumentationsbillede

- Nej
 Ja

Operationstid _____ min.

Blødning under operation _____ ml.

Lot nr.: _____

- Operationsbeskrivelse dikteret
 Supplerende oplysninger til operationsbeskrivelse dikteret

Standardprocedure anvendt, operationsbeskrivelse relevant og dækkende (Se bagside af ark)

- 3 AO-skruer: (NFJ70)
 DHS: (NFJ8Y)
 Marvsøm: (NFJ5Y)
 Hemialloplastik: Anteversion (____°).

Ordinationer noteres på ordinationsark continuation 1

Vurdering af hemialloplastik

- 0 Ikke aktuelt
 1 God stilling
 2 Protese i varus-stilling
 3 Protese i valgus-stilling
 4 Protesen er roteret
 5 Ikke acceptabel stilling

Hoftebrud – Operationsdata – Primær operation

PATIENTLABEL:

Ortopædkirurgisk afdeling M
Operationsbeskrivelser



År

Kontinuationsnummer

F

3 AO-skruer: (NFJ70)

Pt. lejres på ekstensionsleje. Frakturen reponeres under gennemlysning. Lateral adgang. V.h.a. K-tråde placeres 3 skruer gennem collum til caput. Placeringen kontrolleres i gennemlysning. Vicryl lagvist. Vicryl 3-0 (farveløs) i hud.

DHS: (NFJ8Y)

Pt. lejres på ekstensionsleje. Frakturen reponeres under gennemlysning. Lateral adgang bag om vastus lateralis. Via K-tråd placeres glideskrue centralt gennem collum til caput. Glideskruen fikseres ned langs femur med DHS skinne. Placeringen kontrolleres i gennemlysning Vicryl lagvist. Vicryl 3-0 (farveløs) i hud.

Marvsøm: (NFJ5Y)

Pt. lejres på ekstensionsleje og frakturen reponeres under gennemlysning. Adgang proximalt for trochanter major. Femur reames over guidewire. Der indføres et marvsøm i femur som fikseres med glideskrue gennem collum til caput via K-tråd. Der isættes proximal låseskrue og to distale tværskrue. Placeringen kontrolleres i gennemlysning. Vicryl lagvist. Vicryl 3-0 (farveløs) i hud.

Hemialloplastik:

Pt. lejres i sideleje. Bagre adgang til hoftelid. N. ischiadicus identificeres og holdes til side. Leddet åbnes og caput fjernes og udmåles. V.h.a. skabelon afskæres collum og efter opreaming sættes en hemialloplastik med anteversion(____°). Hofte reponeres og findes stabil. Ledkapsel, fascie og subcutis lukkes med vicryl. Vicryl 3-0 (farveløs) i hud.